

OBAVIJEST ZA BOLESNIKE O MIRINGOTOMIJI I POSTAVLJANJU VENTILACIJSKIH CJEVČICA U UHO

Akutna gnojna upala srednjeg uha. Kad je posrijedi ova upala nakupljeni gnoj u bубnjištu izbočuje bubnjić prema van. Gnoj u srednjem uhu može izazvati destrukciju slušnih koščica ili stvaranje priraslica, što rezultira nagluhošću. Kad se nakupi veća količina gnoja u srednjem uhu bubnjić će zbog tlaka gnoja sam puknuti i gnoj će iscuriti iz uha. Puknuće bubnjića biti veće i nepravilnije negoli nakon malog zarezivanja oštrim nožićem.

Zahvat se izvodi zbog akutne gnojne upale srednjeg uha ili zbog dugotrajne sekretorne upale uha zove se **miringotomija**. Operacija se izvodi u općoj anesteziji, a kod odraslih ponekad i u lokalnoj anesteziji. Izvodi se tako što se kroz zvukovod bubnjić zareže oštrim nožićem, a gnojni ili sluzavi sadržaj srednjeg uha se kroz taj otvor pumpicom odstrani odstrani. Nakon miringotomije moguće je uzeti bris gnoja za mikrobiološku analizu.

Dugotrajna serozna (sekretorna) upala uha. Kad je posrijedi ova upala, učini se miringotomija u donjem dijelu bubnjića. Kroz nastali otvor usisava se želatinozni sekret iz srednjeg uha pri čemu se istovremeno može se ugraditi ventilacijska cjevčica. I u ovom slučaju je za djecu potrebna opća anestezija, a za odrasle lokalna anestezija. Bubnjić spontano zacijeli nakon miringotomije. I nakon ponavljanih miringotomija, bubnjić obično zacijeli bez ikakvih promjena sluha.

Komplikacije operacije vrlo su rijeke.

- Iz zvukovoda se nakon operacije može javiti kratkotrajno, slabo krvarenje ili curenje tekućeg sekreta.
- Nakon zahvata javlja se lagani osjećaj nelagode u operiranom uha, a iznimno rijetko blagi bolovi.
- Mjesto miringotomije spontano zacijeli. Nakon postavljanja ventilacijskih cjevčica i naknadnog vađenja za 6 do 12 mjeseci može doći do usporenog cijeljenja bubnjića, sa stvaranjem ožiljka i ovapnjenja bubnjića (miringoskleroza), dok iznimno rijetko ostaje trajna perforacija bubnjića. Bilo koja opća komplikacija (infekcija ili krvarenje) može dovesti do navedenih posljedica. Neliječena bolest također može dovesti do sličnih posljedica.
- Iznimno rijetko se mogu javiti oštećenje sluha ili vrtoglavice

Potvrđujem da sam upoznat(a) s prirodom svoje bolesti, osnovnim načinima liječenja, razlogom za kirurško liječenje i s rizicima operacije, ali i s rizicima koje nosi bolest ako se ne liječi.

Pojava komplikacije može zahtijevati novi, prošireni operacijski zahvat, s čime sam također upoznat(a).

Pristajem na to da se materijali dobiveni u tijeku moga liječenja (npr. tkivo, fotografije, video) koriste u znanstvene, stručne i edukativne svrhe, uz zaštitu mog identiteta.

Posebne napomene bolesnika ili liječnika vezane za operacijski zahvat (npr. nepristajanje na transfuziju, proširenje zahvata i sl.):
