

OBAVIJEŠT ZA BOLESNIKE O PARCIJALNOJ LARINGEKTOMIJI

Grkljan (lat. larinks) je organ koji služi za disanje i govor i štiti donje dišne putova prilikom gutanja. Najvažniji dijelovi grkljana su glasnice, lažne glasnice i epiglotis. Razvoj zločudnih tumora na grkljanu dovodi do promuklosti, otežanog disanja i bolova pri gutanju. Kod određenih lokalizacija i stadija zločudnih tumora grkljana moguće je odstraniti tumore kroz usta (endoskopske operacije, laser), djelomičnim odstranjivanjem dijelova grkljana s tumorom vanjskim pristupom (parcijalne laringektomije) ili zračenjem (radioterapija). U ovom slučaju predviđena je **parcijalna laringektomija**.

Operacija se izvodi u općoj anesteziji, vanjskim pristupom kroz rez na koži vrata. Osim uklanjanja dijela grkljana ponekad je potrebno s tumorom istovremeno odstraniti i okolne limfne čvorove vrata. Nakon svršetka operacije na prednjoj strani vrata, odnosno dušniku, **privremeno** ostaje otvor (traheostoma) koji služi za disanje, a u koji se postavlja cjevčica (trahealna kanila). Stanovito vrijeme nakon operacije (dva do tri tjedna) nije moguće normalno gutanje pa se pacijent hrani preko cijevi koja kroz nos ide u želudac (nazogastrična sonda). Zbog poremećenog disanja i gutanja u dišnom se putu pojačano skuplja sekret, što često izaziva kašalj i pojačano iskašljavanje kroz traheostomu i kanilu. Neposredno nakon ovako opsežnog zahvata normalan govor nije moguć, ali se po zacjeljivanju rana i zatvaranjem traheostome govor uspostavlja. Ponekad je nakon zacjeljenja rana potrebno provesti i dodatnu radioterapiju radi poboljšanja rezultata liječenja.

Parcijalna laringektomija i opća anestezija nose sa sobom rizike i moguće komplikacije. Vjerotrost pojava težih komplikacija je mala, ali je moguća.

Opći rizici bilo koje vrste operacija jesu: krvarenje, tromboza, odnosno embolija, infekcija rana, bolnost, alergijska reakcija na sredstvo ili lijek primijenjen u tijeku operacije, što može rezultirati i anafilaktičkim šokom i njegovim mogućim posljedicama (u vrlo rijetkim slučajevima teškim posljedicama, uključujući i smrt).

Specifični rizici. Parcijalna laringektomija ponekad može imati posljedice i rizike koji su vezani za operativnu ozljeđu okolnih struktura:

- Postoperativno se mogu pojaviti oštećenje funkcije donje grane ličnog živca (pomičnost donje usne), smetnje u pomičnosti ramena i nadlaktice („viseće rame“), oštećenje pomičnosti jezika.
- Poremećaji zacjeljivanja rana, fistule, skupljanje sukrvica, limfe i tkivne tekućine u operiranom području. Stvaranje većih ožiljaka i keloida. U slučaju rekonstrukcije kožnim i mišićnim režnjevima moguće je propadanje režnja, što može zahtijevati dodatnu operativnu intervenciju.

Potvrđujem da sam upoznat(a) s prirodom svoje bolesti, osnovnim načinima liječenja i razlogom za kirurško liječenje.

Potvrđujem da sam upoznat(a) s rizicima operacije, ali i s rizicima koje nosi bolest ako se ne liječi.

Pojava komplikacije može zahtijevati novi, prošireni operacijski zahvat, s čime sam također upoznat(a).

Pristajem na to da se materijali dobiveni u tijeku moga liječenja (npr. tkivo, fotografije, video) koriste u znanstvene, stručne i edukativne svrhe, uz zaštitu mog identiteta.

Posebne napomene bolesnika ili liječnika vezane za operacijski zahvat (npr. nepristajanje na transfuziju, proširenje zahvata i sl.):
